

OTOVET

SOLUÇÃO OTOLÓGICA

USO VETERINÁRIO

Uso Tópico



FÓRMULA

Cada 100mL contém:

Enrofloxacina	0,5g
Clotrimazol	1,0g
Dexametasona (fosfato dissódico)	0,132g*
Cloridrato de lidocaína	2,0g
Veículo q.s.p.	100,0mL

*Equivale a 0,10g de Dexametasona base.

INDICAÇÕES

OTOVET é uma solução otológica antibacteriana, antimicótica, anti-inflamatória e analgésica. A Enrofloxacina e o Clotrimazol atuam no controle de otites causadas por bactérias e fungos. A Dexametasona é um potente anti-inflamatório de ação local que proporciona maior conforto ao animal pela diminuição da inflamação. O Cloridrato de lidocaína é um anestésico local utilizado no tratamento da dor com baixa toxicidade proporcionando alívio imediato e favorecendo o processo de cura. Esta associação faz de **OTOVET** um medicamento completo e moderno na indicação para otites em todas as espécies animais, de origem bacteriana e fúngica, tais como: **Bactérias:** *Aeromonas hydrophila*, *Escherichia coli*, *Microsporium canis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius*, *Streptococcus pyogenes* e *Klebsiella* spp. **Fungos:** *Arpergillus* spp., *Candida albicans*, *Enterobacter* spp, *Epidermophyton floccosum*, *Mallassezia pachydermatis*, *Proteus mirabilis*, *Trichophyton rubrum* e *Trichophyton mentagrophytes*.

MODO DE USAR

Uso tópico. Deve ser aplicado no conduto auditivo, após a limpeza do mesmo para remoção de todo o excesso de cerúmen, crostas e outras sujidades.

Após a limpeza posicionar a cabeça do animal de forma que possa instilar **OTOVET** no conduto auditivo, em seguida massageie suavemente a orelha para uma distribuição uniforme do medicamento.

POSOLOGIA

Animais com menos de 15Kg	instilar 3 a 6 gotas 2 a 3 vezes ao dia.
Animais acima de 15Kg	instilar 6 a 12 gotas 2 a 3 vezes ao dia.

Manter o tratamento durante 10 dias ou a critério do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES

Antes da instilação, recomenda-se limpar cuidadosamente a orelha do animal, removendo cerúmen, pus, excesso de pelos, crosta e demais sujidades.

Ocorrendo reação individual de hipersensibilidade a um ou mais componentes da fórmula, o tratamento deve ser suspenso.

APRESENTAÇÃO

Frasco contendo 20mL.

ACOMPANHA BICO GOTEJADOR

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 2.786/87 em 26/11/1987.

Responsável técnico:

Dr. Naur Bellusci Filho CRMV-SP nº 6516

Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário

Proprietário e Fabricante:

BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - 14.876-150

Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500

CNPJ: 00.256.591/0001-62 - Insc. Est. 391.038.579.113



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 702 3551
www.biofarm.com.br



EMBALAGEM RECICLÁVEL



BIOFARM

Tecnologia em veterinária

020282.040719.NV1